

Paronychia – Onychia (nagelwalontsteking – nagelriemontsteking)

Beschrijving:

Verwaarloosde kwetsuren zijn vaak de oorzaak. Overzorgde kwetsuren geven immers een verhoogde kans op aantasting van het nagelbed door gistcellen.

Paronychia ontstaat meestal na een verwonding in de nagelwal door vb.

- het stoten van de teen
- ondeskundig verzorgen van de nagel

Slechte verzorging van deze wondjes verhoogt de kans op infectie. Roodheid, pijn, warmte en zwelling doen de nagelriem lossen, waardoor andere bacteriën of micro-organismen, zoals candida albicans kunnen binnendringen.

Behalve door infectie na een trauma kan paronychia ook veroorzaakt worden door vb. diabetes mellitus.

Onychia is een ontsteking van matrix en nagelbed veroorzaakt door paronychia.

Paronychia (nagelwalontsteking) en onychia (nagelriemontsteking) komen meestal samen voor. De omgeving van de nagel is rood en gezwollen. De nagelplaat kan volledig misvormd raken of kleiner worden bij een onverzorgde ontsteking.



paronychia en onychia

Behandeling:

Ontstekingsverschijnselen moeten behandeld worden met antimycotische of antibiotische middelen. Zij moeten voorgeschreven worden door een arts. In ernstige gevallen zal de arts de nagel chirurgisch verwijderen.

De kloppende pijn veroorzaakt door ettervorming kan afnemen door het pus te draineren.